

Stadieneinteilung des anaplastischen Schilddrüsenkarzinoms

Stadium nach AJCC	Gruppierung der Merkmale	Beschreibung des Stadiums des undifferenzierten Schilddrüsenkarzinom
IVa	T1, T2 oder T3a, N0, M0	Beliebige Tumorgröße, jedoch beschränkt auf die Schilddrüse (T1, T2 oder T3), ohne Befall benachbarter Lymphknoten (N0), keine Fernmetastasen (M0)
IVb	T1, T2 oder T3a, N1, M0	Beliebige Tumorgröße, jedoch beschränkt auf die Schilddrüse (T1, T2 oder T3a), mit Befall benachbarter Lymphknoten (N1), keine Fernmetastasen (M0)
	oder	
	T3b, alle N, M0	Beliebige Tumorgröße, mit Ausbreitung über die Schilddrüse hinaus in die Zungenbeinmuskulatur (T3b), mit oder ohne Befall benachbarter Lymphknoten (alle N), keine Fernmetastasen (M0)
	oder	
	T4, alle N, M0	Beliebige Tumorgröße mit wesentlicher Ausbreitung über die Schilddrüse hinaus in benachbartes Gewebe im Hals wie Kehlkopf, Luftröhre, Speiseröhre, Wirbelsäule oder große benachbarte Blutgefäße (T4), mit oder ohne Befall benachbarter Lymphknoten (alle N), keine Fernmetastasen (M0)
IVc	Alle T, alle N, M1	Beliebige Tumorgröße (alle T), möglicher Befall benachbarter Lymphknoten (alle N), Fernmetastasen in anderen Körperteilen wie entfernten Lymphknoten, inneren Organen, Knochen usw. (M1)