

Les différents stades du cancer différencié de la thyroïde

Stade AJCC	Âge au moment du diagnostic	Groupe de stades	Description du stade du cancer différencié de la thyroïde*.
I	moins de 55 ans	Tout T, Tout N, M0	Le cancer est d'une taille quelconque (tout T) et peut ou non s'être propagé aux ganglions lymphatiques voisins (tout N). Il ne s'est pas propagé à des sites distants (M0).
	ou		
	55 ans ou plus	T1, N0, M0	Le cancer ne mesure pas plus de 2 cm de diamètre et est confiné à la thyroïde (T1). Il ne s'est pas propagé aux ganglions lymphatiques voisins (N0) ou à des sites distants (M0).
	ou		
	55 ans ou plus	T2, N0, M0	Le cancer a un diamètre supérieur à 2 cm mais inférieur à 4 cm et est confiné à la thyroïde (T2). Il ne s'est pas propagé aux ganglions lymphatiques voisins (N0) ou à des sites distants (M0).
II	moins de 55 ans	Tout T, Tout N, M1	Le cancer peut être de n'importe quelle taille (Any T). Il peut ou non s'être propagé aux ganglions lymphatiques voisins (tout N). Il s'est propagé à d'autres parties du corps, telles que des ganglions lymphatiques distants, des organes internes, des os, etc. (M1).
	ou		
	55 ans ou plus	T1, N1, M0	Le cancer ne mesure pas plus de 2 cm de diamètre et est confiné à la thyroïde (T1). Il s'est propagé aux ganglions lymphatiques voisins (N1). Il ne s'est pas propagé à des sites distants (M0).
	ou		
	55 ans ou plus	T2, N1, M0	Le cancer a un diamètre supérieur à 2 cm mais inférieur à 4 cm et est confiné à la thyroïde (T2). Il s'est propagé aux ganglions lymphatiques voisins (N1). Il ne s'est pas propagé à des sites distants (M0).
	ou		
	55 ans ou plus	T3a ou T3b, Tout N, M0	Le cancer est supérieur à 4 cm mais est confiné à la thyroïde (T3a) ou il s'est développé dans les muscles de la sangle entourant la thyroïde (T3b). Il peut ou non s'être propagé aux ganglions lymphatiques voisins (tout N). Il ne s'est pas propagé à des sites distants (M0).
III	55 ans ou plus	T4a, Tout N, M0	Le cancer est de n'importe quelle taille et s'est largement développé au-delà de la glande thyroïde pour atteindre les tissus voisins du cou, tels que le larynx (boîte vocale), la trachée (trachée), l'œsophage (tube reliant la gorge à l'estomac) ou le nerf du larynx (T4a). Il peut ou non s'être propagé aux ganglions lymphatiques voisins (tout N). Il ne s'est pas propagé à des sites distants (M0).
IVA	55 ans ou plus	T4b, Tout N, M0	Le cancer, quelle que soit sa taille, s'est largement développé au-delà de la glande thyroïde, vers la colonne vertébrale ou dans les gros vaisseaux sanguins voisins (T4b). Il peut ou non s'être propagé aux ganglions lymphatiques voisins (tout N). Il ne s'est pas propagé à des sites distants (M0).
IVB	55 ans ou plus	Tout T, Tout N, M1	Le cancer est de toute taille (tout T) et peut ou non s'être propagé aux ganglions lymphatiques voisins (tout N). Il s'est propagé à d'autres parties du corps, telles que des ganglions lymphatiques distants, des organes internes, des os, etc. (M1).